

Link do produktu: <https://pul-pet.pl/zeco-owoskop-tester-zaplodnienia-jajek-p-5999.html>



ZECO Owoskop - tester zapłodnienia jajek

Cena	44,49 zł
Kod producenta	aq-8053
Kod EAN	5905280162644

Opis produktu

Dzięki dwóm wymiennym końcówkom możliwe jest prześwietlanie jaj różnych gatunków ptaków i gadów. Oferowana prześwietlarka zasilana jest z gniazda sieciowego o napięciu 220-240V. Sama obsługa urządzenia nie powinna nikomu sprawić najmniejszego problemu. Całość wyposażenia zestawu pozwala na natychmiastowe użycie owoskopu, bez potrzeby zakupu żadnych dodatkowych elementów.

Niniejsza prześwietlarka do jaj zapewnia odpowiednią widoczność rozwijającego się wewnątrz zarodka. Prześwietlarka wyposażona została w specjalną diodę LED o wysokiej wydajności działania, która nie ulegając przegrzaniu, nie stanowi zagrożenia dla prześwietlanych jaj. Takie rozwiązanie jest korzystne i dużo bardziej skuteczne niż użycie standardowej żarówki.

Przegląd jaj:

Pierwszego prześwietlenia powinno się dokonać po 7- dniu inkubacji. Należy bezwzględnie przejrzeć wszystkie jaja lęgowe. Dopiero po upływie tylu dni hodowca ma możliwość sprawdzenia czy jajko było załężone. W czasie prześwietlania skontrolować można rozwój zarodka. W przypadku kiedy nie widać siateczki czerwonych żyłek oznacza to, że jajko nie zostało zapłodnione i należy je koniecznie usunąć. Jajka nie zapłodnione pozostawione w inkubatorze gdzie występuje wysoka wilgotność i temperatura, szybko się zepsują, a wydzielanie przez nie gazy mogą zaburzyć proces rozwoju załążków w jajach zapłodnionych.

Po upływie każdego tygodnia należy ponownie przejrzeć wszystkie jaja. Może się zdarzyć, że w niektórych jajach zarodek obumarł z przyczyn od nas niezależnych np: słaby embrion, wady genetyczne, chów wsobny. Takie jaja natychmiast należy usunąć, gdyż w jajach, w których wykształciły się już naczynia krwionośne namnażają się bakterie. Nie usuwanie takich jaj może spowodować utratę całego lęgu.

Ostatni przegląd jaj powinien mieć miejsce na około 3-4 dni przed wykuciem, w momencie kiedy kończymy przekręcanie jaj. Usuwamy z inkubatora jaja, które wskazują na obumarcia embrionów i brak jest w nich widocznych ruchów piskląt.

Przeglądając jaja należy zwrócić również uwagę na wielkość komory powietrznej w jajku, w celu sprawdzenia czy zachowana jest odpowiednia wilgotność powietrza w inkubatorze. Jest to obok temperatury najważniejszy element decydujący o powodzeniu inkubacji.

W świeżym jajku komora jest bardzo mała, natomiast wraz z upływem czasu powiększa się proporcjonalnie do długości wylęgania. W sytuacji kiedy komora jest za duża może to świadczyć o tym że jajko utraciło za dużo wody. Zachodzi wówczas potrzeba podniesienia wilgotności wewnątrz inkubatora. W przeciwnym wypadku, gdy komora jest za mała należy wilgotność zmniejszyć.

Oferowany owoskop ZECO wyprodukowany został przez renomowaną firmę Super Reptile.